con il patrocinio e la collaborazione di:
CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

con il contributo e la collaborazione di:
Kiwanis
Club di CASALE MONFERRATO

ib
IS s.c. BALBOA
Casale Monferrato

1985-2015 **ANGSA**
onlus
Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici

presenta
la
PRESA IN CARICO
a 360°
delle persone
con Disturbi nello Spettro dell'Autismo

29 settembre 2018
orario 9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
presso
Teatro Municipale
CASALE MONFERRATO
piazza Castello 9

con il patrocinio di:

FIA
FONDAZIONE ITALIANA
PER L'ALITISMO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA ALESSANDRIA

ASL

Anffas

S.O.F.I.A.

id iniziativa: 19280

Costituzione della rete pediatria- neuropsichiatria infantile: necessità di un accordo e sue finalità

Maria Luisa Scattoni
Istituto Superiore di Sanità

marialuisa.scattoni@iss.it

Rilevanza DIAGNOSI PRECOCE

[School Age Outcomes of Children Diagnosed Early and Later with Autism Spectrum Disorder. \[J Autism Dev Disord. 2017 Sep 14.\]](#)

Un nuovo studio del Centro di ricerca sull'autismo Olga Tennison ha confrontato i risultati di coloro che hanno ricevuto una diagnosi precoce con quelli di coloro che hanno ricevuto una diagnosi più tardiva. Essi includevano: l'accesso a un maggior numero di interventi, un migliore livello verbale e di apprendimento in età scolare, maggiori probabilità di frequentare la scuola statale (e non le scuole speciali) e la necessità di un sostegno meno costante in seguito.

Sfida della ricerca clinica:

24 mesi: diagnosi definitiva

18 mesi: diagnosi
provvisoria

12 mesi: diagnosi di rischio

0-12 mesi: indici di rischio

Riconoscimento precoce: i metodi

- Parental reports
- Home-videos

Studi
retrospettivi

Studi
prospettivi

- Siblings
- *Popolazioni alto-rischio*

REPORT DEI GENITORI: l'esperienza dei genitori con i primi segni

I primi problemi vengono riconosciuti retrospettivamente dai genitori tra i 12 ed i 18 mesi:

A partire dai 2 anni, le famiglie chiedono una consultazione medica per:

- ✓ Ritardo linguaggio
- ✓ Scarsa reciprocità
- ✓ Disturbi regolazione
- ✓ Stereotipie

il 75% riporta problemi al di sotto dei 18 mesi

Il 25% li riporta al di sotto dei 12 mesi

I genitori riportano come primi segnali:

- ✓ la mancanza di sorriso sociale,
- ✓ la scarsa risposta al nome,
- ✓ la mancanza di responsività ed iniziativa
- ✓ le difficoltà nello sviluppo motorio.

Atipie precoci del movimento e nello sviluppo motorio

ATTIVITÀ MOTORIA RIDOTTA

La motricità spontanea (GMs) evolve in movimenti intenzionali con i quali il bambino invia e raccoglie informazioni

L'attività motoria viene utilizzata nel primo anno di vita per connettersi con l'ambiente sociale

Movimenti oculari e spostamenti della direzione dello sguardo

Imitazione ed ampliamento del repertorio motorio

Preferenza per il movimento biologico

Campanelli d'allarme – Ricerca italiana

5 mesi: posizione supina

Original article

An exploration of symmetry in early autism spectrum disorders: Analysis of lying

Gianluca Esposito^{a,*}, Paola Venuti^a, Sandra Maestro^b, Filippo Muratori^b

^a Department of Cognitive Science, University of Trento, Italy
^b Division of Child Neuropsychiatry, IRCCS Stella Maris and University of Pisa, Pisa, Italy
 Received 14 November 2007; received in revised form 9 April 2008; accepted 19 April 2008

12 mesi: analisi della deambulazione

Original article

Analysis of unsupported gait in toddlers with autism

Gianluca Esposito^{a,b,*}, Paola Venuti^a, Fabio Apicella^c, Filippo Muratori^c

^a Department of Cognitive Science and Education, University of Trento, Italy
^b Kavala Research Unit, RIKEN Brain Science Institute, Saitama, Japan
^c Division of Child Neuropsychiatry, IRCCS Stella Maris and University of Pisa, Italy
 Received 14 April 2010; received in revised form 18 June 2010; accepted 21 July 2010

Postura
simmetrica

Postura non
simmetrica

Postura
simmetrica

Postura non
simmetrica

Comportamenti ripetitivi

Bilateral Patterns of Repetitive Movements in 6- to 12-Month-Old Infants with Autism Spectrum Disorders

*Giulia Purpura^{1†}, Valeria Costanzo^{1†}, Natasha Chericoni¹, Maria Puopolo²,
Maria Luisa Scattoni³, Filippo Muratori^{1,4} and Fabio Apicella^{1*}*

¹ Department of Developmental Neuroscience, IRCCS Stella Maris Foundation, Pisa, Italy, ² Department of Cell Biology and Neurosciences, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy, ³ Research Coordination and Support Service, Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy, ⁴ Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa, Pisa, Italy

Movimenti ripetitivi: primo anno di vita

Atipie precoci della comunicazione

JIDR Journal of Intellectual Disability Research
Published on behalf of menap and in association with IASSID

Journal of Intellectual Disability Research

doi: 10.1111/j.1365-2788.2010.01252.x

VOLUME 54 PART 3 pp 216-223

**Understanding
a study of the**

G. Esposito & P. Venuti

ELSEVIER

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Research in Developmental Disabilities

Differential brain responses to cries of infants with autistic disorder and typical development: An fMRI study

Paola Venuti^{a,*}, Andrea Caria^{a,b}, Gianluca Esposito^{a,c}, Nicola De Pisapia^a, Marc H. Bornstein^d,
Simona de Falco^a

^aDepartment of Cognitive Science and Education, University of Trento, Trento, Italy

^bInstitute of Medical Psychology and Behavioral Neurobiology, Eberhard-Karls-University of Tübingen, Tübingen, Germany

^cUnit for Affiliative Social Behavior, RIKEN Brain Science Institute, Saitama, Japan

^dChild and Family Research, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, USA

Atipie precoci nell'interazione: da 6 a 12 mesi

Hindawi Publishing Corporation
Autism Research and Treatment
Volume 2013, Article ID 705895, 12 pages
<http://dx.doi.org/10.1155/2013/705895>

Research Article

Reciprocity in Interaction: A Window on the First Year of Life in Autism

Fabio Apicella,¹ Natasha Chericoni,¹ Valeria Costanzo,¹ Sara Baldini,¹ Lucia Billeci,² David Cohen,³ and Filippo Muratori^{1,4}

Intersubjective disruptions and caregiver-infant interaction in early Autistic Disorder

Filippo Muratori, Fabio Apicella*, Pietro Muratori, Sandra Maestro

Division of Child Neurology and Psychiatry, University of Pisa, Stella Maris Scientific Institute, Via dei Giacinti, 2, I-56108 Colabrone, Pisa, Italy

Red flags – Campanelli d'allarme

Riconoscimento precoce: i metodi

Quale popolazione?

- Ad alto rischio: fratellini, prematuri, SGA

- Popolazione generale (>3 anni)

RECLUTAMENTO:

Bambini a basso rischio di ASD

1. NEONATI NATI A TERMINE

Bambini ad alto rischio di ASD

1. FRATELLINI DI BAMBINI CON ASD
2. PREMATURI (26-31 settimana gestazionale)
3. SGA (piccoli per età gestazionale)

Progetto NIDA

Responsabile Scientifico Dr. Maria Luisa Scattoni

Incontri	Data	Controllo
7-10 giorni	☐	Pianto/GMs/attenzione
6 settimane	☐	Pianto/GMs
12 settimane	☐	Pianto/GMs
18 settimane	☐	Pianto/GMs
24 settimane	☐	Pianto/GMs
6 mesi	☐	Protocollo dello sviluppo
12 mesi	☐	Protocollo dello sviluppo
18 mesi	☐	Protocollo dello sviluppo
24 mesi	☐	Protocollo dello sviluppo
36 mesi	☐	Protocollo dello sviluppo

MONITORAGGIO DEGLI INDICI DI BENESSERE

PROTOCOLLO DI
RICERCA

PROTOCOLLO
CLINICO STANDARDIZZATO

RIDOTTA ATTENZIONE VERSO STIMOLI SOCIALI

SCIENTIFIC REPORTS

OPEN

Difference in Visual Social Predispositions Between Newborns at Low- and High-risk for Autism

Received: 03 August 2015

Accepted: 29 April 2016

Published: 20 May 2016

Elisa Di Giorgio¹, Elisa Frasnelli^{1,2}, Orsola Rosa Salva¹, Scattoni Maria Luisa³, Maria Puopolo³, Daniela Tosoni¹, NIDA-Network[§], Francesca Simion^{4,5} & Giorgio Vallortigara¹

Some key behavioral traits of Autism Spectrum Disorder (ASD) have been hypothesized to be due to

AREA OF INTEREST: FACE AND GAZE PERCEPTION

1)

UPRIGHT vs.
INVERTED FACE-LIKE

2)

DIRECT vs.
AVERTED EYE-GAZE

Pianto neonatale spontaneo

Il pianto neonatale: utilità diagnostica

In una serie di studi è stato esaminato il pianto neonatale di bambini con condizioni mediche legate a specifici danni neurologici ed è stato dimostrato come la frequenza fondamentale (f_0) sia particolarmente influenzata.

Alti livelli di f_0 :

Danni cerebrali
Meningite
Ipossia

Bassi livelli di f_0 :

Ipotiroidismo
Bambini con trisomia 13, 18, 21

PIANTO NEONATALE: profilo longitudinale di F_0

F_0 developmental trajectory

Monitorare i fratellini è cruciale

Analisi dei General Movements

Prechtl's Method on General Movement Assessment

GM Optimality List for Preterm GMs and Writhing Movements

(Ferrari et al 1990, modified)

Name: _____

Date of birth: _____

Recording date: _____

- 1. Quality normal
- poor re
- chaotic
- cramp
- 2. Sequence variab
- monoto
- similar
- disorg

Assessment of Motor Repertoire - 3 to 5 Months

Christa Einspieler and Arie Bos, the GM Trust 2001

Name:

born: Postmenstrual Age: Birth weight:

Recording Date: Postterm Age:

Number of movement patterns observed: normal (N) abnormal (A)

N A fidgety movements	N hand-face contact	N A legs lift, flexion at knees
N A swiping movements	N hand-mouth contact	N A legs lift extension at knees
N A wiggling-oscillating movem.	N hand-hand contact	N hand-knee contact
N A saccadic arm movements	N hand-hand manipulation	N A arching
N A kicking	N A fiddling / clothes, blanket	N A trunk rotation
N A excitement bursts	N reaching	N axial rolling
A 'cha-cha-cha movements'	N A foot-foot contact	N A visual scanning
N A smiles	N foot-foot manipulation	N hand regard
N A mouth movements	N A segmental movements arms	N head anteflexion
N A tongue movements	N A segmental movements legs	A arm movements in circles
N A head rotation	A segm: discrepancy arm-leg	A almost no leg movements

Number of postural patterns observed: normal (N) abnormal (A)

N A head in midline (20 °)	N variable finger postures	A hyperextension of the neck
N A symmetrical	A predominant fisting	A hyperextension of trunk
N A spontaneous ATNR absent or could be overcome	A finger spreading	A extended arms/ on / above surface are predominant
A body and limbs 'flat' on surface	A few finger postures	A extended legs / on / above surface are predominant
	A synchronised opening and closing of the fingers	

Movement character (global score):

N smooth and fluent	A stiff	A predominantly slow speed
A jerky	A cramped	A predominantly fast speed
A monotonous	A synchronous	A predomin. large amplitude
A tremulous	A cramped-synchronised	A predomin. small amplitude

GENERAL MOVEMENTS: traiettorie dello sviluppo

GM optimality score:
Maximum 18; Minimum 8

WRITHING

Motor optimality score:
Maximum 28; Minimum 5

FIDGETY

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL NEUROSVILUPPO

	6m	12m	18m	24m	36m
<i>Vineland II</i>		✓	✓	✓	✓
<i>MacArthur</i>		✓	✓	✓	✓
<i>Questionario Temperamento</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>First Year Inventory</i>		✓			
<i>M-CHAT</i>			✓		
<i>Child Behavior Checklist</i>			✓	✓	✓
<i>Griffiths (GMDS)</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Early Motor Questionnaire</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Autism Observation Scale for Infants</i>	✓	✓			
<i>ADOS-2 (modulo Toddler)</i>		✓	✓	✓	
<i>ADOS-2 (modulo 1 o 2)</i>					✓
<i>Autism Diagnostic Interview – Revised</i>					✓
<i>Parenting Stress Index</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Social Communication Questionnaire</i>					✓

Protocollo di sorveglianza

Protocollo clinico-osservazionale per il monitoraggio dello sviluppo vocale-sociale-motorio-cognitivo (dalla nascita ai tre anni di vita) di neonati/lattanti/bambini ad alto rischio

Qualora vengano individuate specifiche difficoltà i bambini potranno essere indirizzati verso forme di intervento precoce.

Quale popolazione?

- Ad alto rischio: fratellini, prematuri, SGA
- Popolazione generale (0-3 anni)

Individuare la **strategia**:

Individuare la **strategia**:

Eur Child Adolesc Psychiatry (2014) 23:1005–1021
DOI 10.1007/s00787-014-0555-6

REVIEW

Screening for autism spectrum disorders: state of the art in Europe

Patricia García-Primo · Annika Hellendoorn · Tony Charman · Herbert Roeyers · Mieke Dereu · Bernadette Roge · Sophie Baduel · Filippo Muratori · Antonio Narzisi · Emma Van Daalen · Irma Moilanen · Manuel Posada de la Paz · Ricardo Canal-Bedia

Oltre 70,000 bambini in Europa → 18 diverse procedure di screening

LEVEL 1: Population-based screening

Table 1 ASD screening tools

Screening tool (long name)	Short name	Admin. time (min)	Admin. age (months)	Admin. method ^b	Items	Sensitivity	Specificity
Level 1 ^a							
Checklist for Autism in Toddlers [16, 17]	CHAT	5-10	18	Parent + clinician rated	9 + 5	0.18-0.38	0.98-1.0
Social Communication Questionnaire [18]	SCQ	15-20	36-82	Parent rated	40	0.74	0.54
Modified-Checklist for Autism in Toddlers [19]	M-CHAT	5-10	18-30	Parent rated	23	0.87	0.99
Quantitative Checklist for Autism in Toddlers [20]	Q-CHAT	5	16-30	Parent rated	25	-	-
Communication and Social Behaviour Scale-Infant and Toddlers Checklist [21]	CSBS-DP	5-10	16-30	Parent rated	24	-	-
Early Screening Autistic Traits Questionnaire [22]	ESAT	10	14-15	Parent + child care worker	14	-	-
First Year Inventory [23]	FYI	10	12	Parent rated	59	-	-
Checklist for Early Signs of Developmental Disorders [24]	CESDD			Child care worker rated	12		
Autism Observation Scale for Infants [11]	AOSI	10	6-1	Clinician rated	18	0.84	0.98
Young autism and other developmental disorders checkup tool [25]	YACHT-18	10	18	Clinician rated	18	0.82	0.86
The Social Attention and Communication Study [26]	SACS	5	8, 12, 18, 24	Clinician rated	15	0.83	0.99
Joint attention-observation schedule [27]	JA-OBS	5-10	20-48	Child Nurse Rated	5	0.86	-

LEVEL 2: ASD specific screening tool after development delay confirmation at a routine developmental surveillance

Table 1 ASD screening tools

Screening tool (long name)	Short name	Admin. time (min)	Admin. age (months)	Admin. method ^b	Items	Sensitivity	Specificity
Level 2 ^a							
Developmental Behaviour Checklist-primary care version [28]	DBC-ES	5-10	18-48	Parent rated	96	0.83	0.48
Screening tool for autism in 2 years old [29]	STAT	20	24-35	Child care worker rated	12	0.83	0.86
Screening for infants with developmental deficits and/or autism [30]	SEEK	30-40	8	Parent + clinician rated	9 + 28	-	-
Pervasive Developmental Disorders Rating Scale [31]	PDDRS	60	>12	Parent rated	51	-	-
Autistic behavioural indicators instrument [32]	ABII	30	24-72	Clinician rated	18	-	-
Autism Behaviour Checklist [33]	ABC	15	>36	Parent rated	57	0.58	0.76
Childhood Rating Scale [34]	CARS	15-20	>24	Clinician rated	15	0.92-0.98	0.85
Autism detection in early childhood [35]	ADEC	12	12	Parent or nurse rated	16	0.79-0.94 ^a	0.88-1.00 ^a
Baby and Infant Screen for Children with Autism Traits [36-39]	BISCUIT	15	17-37	Parent rated	42	0.84	0.86
Three-item direct observation screen test [40]	TIDOS	5	18-60	Clinician rated	3	0.95	0.85

^a Level 1 = population-based screening; level 2 = ASD specific screening tool after developmental delay risk confirmation at a routine developmental surveillance

^b Clinician = usually paediatrician or primary care physician

1

Piattaforma Web

2

CHAT-MCHAT-QCHAT

QUESTIONARIO
 Rispondete alle seguenti domande: ad vostro bambino risponde il cerchio più appropriato. Cercate di rispondere, se possibile, a tutte le domande.

1. Il vostro bambino vi guarda quando lo chiamate per nome?
 sempre
 spesso
 a volte
 raramente
 mai

2. Quanto è facile per voi stabilire il contatto oculare con il vostro bambino?
 molto facile
 abbastanza facile
 abbastanza difficile
 molto difficile
 impossibile

3. Il vostro bambino allinea gli oggetti quando gioca da solo?
 sempre
 spesso
 a volte
 raramente
 mai

4. Qualche persona comprende facilmente il linguaggio del vostro bambino?
 sempre
 spesso
 a volte
 raramente
 mai
 il mio bambino non parla

5. Il vostro bambino indica con l'indice per richiedere qualcosa? (es. un giocattolo che non riesce a raggiungere).
 molte volte al giorno
 qualche volta al giorno
 poche volte al giorno
 raramente
 mai

6. Il vostro bambino indica con l'indice per condividere un interesse con voi? (es. indica qualcosa che vede e lo interessa).
 molte volte al giorno
 qualche volta al giorno
 poche volte al giorno
 raramente
 mai

7. Per quanto tempo il vostro bambino può mantenere il suo interesse su un oggetto che gira (es. lavatrice, ventilatore, ruote delle macchinine)?
 almeno un'ora
 mezz'ora
 dai 15 minuti
 meno di un minuto

8. Quanto parla il vostro bambino e in grado di dire?
 nessuno - non ha ancora iniziato a parlare
 parole di 2 parole
 da 10 parole
 da 100 parole
 più di 100 parole

9. Il vostro bambino gioca "a fare finta"? (es. fa finta di prendere cura di una bambola o fa finta di parlare con un telefono giocattolo)?
 molte volte al giorno
 qualche volta al giorno
 poche volte al giorno
 raramente
 mai

10. Il vostro bambino segue con lo sguardo dove voi state guardando?
 molte volte al giorno
 qualche volta al giorno
 poche volte al giorno
 raramente
 mai

11. Con quale frequenza il vostro bambino ammassa e lancia oggetti inutilmente?
 molte volte al giorno
 qualche volta al giorno
 poche volte al giorno
 raramente
 mai

12. Il vostro bambino "usa" la vostra mano per compiere un'azione che non sa fare? (es. mette la vostra mano sulla maniglia della porta quando vuole che la aprite o su un giocattolo quando vuole che lo attiviate).
 molte volte al giorno
 qualche volta al giorno
 poche volte al giorno
 raramente
 mai

3

Valutazione diagnostica

- ADOS
- Griffiths' Mental Development Scale
- Vineland Adaptive Behavior Scale

Checklist for Autism in Toddlers (1992, Baron-Cohen et al.)

Test somministrato a
18 mesi di vita

Domande ai genitori e osservazione diretta di
comportamenti 'bersaglio'

Pointing dichiarativo

Attenzione Condivisa

Gioco di Finzione

M-CHAT

Questionario con 23 Items (6 sono critici)

Presenza/assenza di competenze/sintomi

Somministrato a 18 mesi di vita

Modified Checklist for Autism in Toddlers

2001, Robbins et al.

Items critici

2 Vostro figlio si interessa agli altri bambini?

9 Vostro figlio vi porta mai degli oggetti per mostrarvi qualcosa?

14 Vostro figlio risponde al suo nome quando lo chiamate?

7 Vostro figlio usa mai l'indicare col dito indice per segnalare interesse in qualcosa?

13 Vostro figlio vi imita? (Ad esempio se fate una faccia cerca di imitarla?)

15 Se indicate con il dito indice un giocattolo dalla parte opposta della stanza, vostro figlio lo guarda?

Suggerimenti per un programma di SCREENING

Modified Checklist for Autism in Toddlers-Revised-Follow-Up 2014, Robbins

- 20 Items
- (Nuovo item) Guarda nei tuoi occhi quando stai parlando con lui?

1. **RISCHIO-BASSO (0-2)** Valutalo di nuovo dopo il secondo compleanno. **Nessuna azione ulteriore**
2. **RISCHIO-MEDIO (3-7)** Somministra **l'Intervista di Follow-Up**.
 - A) Se il punteggio rimane a 2 o > bambino con screening positivo. **Azione richiesta**
 - B) Se il punteggio è 0-1, bambino con screening negativo. **Nessuna azione ulteriore**
3. **RISCHIO-ALTO (8-20)** *Bypassa* **l'Intervista di Follow-Up**. **Azione richiesta**

NIH awards nearly \$100 million for Autism Centers of Excellence program | National Institutes of Health (NIH)

NEWS RELEASES

Thursday, September 7, 2017

NIH awards nearly \$100 million for Autism Centers of Excellence program

2017 Network Grants

George Washington University, Washington, D.C. - Investigating how ASD differs between boys and girls

University of North Carolina, Chapel Hill - Tracking brain development, behavior as ASD progresses

Drexel University, Philadelphia - Evaluating autism screening for all toddlers.

Florida State University, Tallahassee - Testing parent coaching, home intervention for toddlers

2017 Center Grants

University of California, Davis - Improving ASD treatments based on symptoms, features

University of California, Los Angeles - Tracing ASD symptoms to their origins

Yale University, New Haven, Connecticut - Examining development of functional brain connections

Duke University, Durham, North Carolina - Understanding and potentially treating ASD-ADHD combination

Emory University, Atlanta - Studying social interaction to identify the early signs of ASD

Drexel researcher wins \$11 million autism grant

Updated: SEPTEMBER 7, 2017 — 11:54 AM EDT

Craig Newschaffer, founding director of the Drexel Autism Institute and past ACE recipient, said Robins' project "responds to a gap in the evidence base around early detection and intervention highlighted by the U.S. Preventative Services Task Force and will have major impact on practice."

8000 bambini in 5 anni

Programma di SCREENING: sostenibile?

- Non ci sono strumenti efficaci/efficienti per lo screening nella popolazione generale
- È fondamentale migliorare la sensibilità e la specificità

Tutti limitati all'ASD!

Individuare la **strategia**

Procedure attive per la diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo ed in particolare del disturbo dello spettro autistico

Rilevazione

Rilevazione

Nel caso d'invio a un servizio specialistico di Neuropsichiatria Infantile, sono previste modalità di raccordi formalizzati?

Sorveglianza dello sviluppo:

- Consolidamento della rete di servizi
- Informatizzazione delle attività delle NPIA regionali e dei Bilanci di Salute
- Percorsi di formazione condivisi
- Protocollo di sorveglianza del neurosviluppo (bilanci di salute)

3 NOV
2017

LAVORO E PROFESSIONE

Autismo&Co: nasce la rete pediatria-neuropsichiatria infantile per la diagnosi precoce

SEGNALIBRO | ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

di *Maria Luisa Scattoni*, ricercatrice Iss e coordinatrice Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico

TAG

Pediatria
Ricerca

Istituto superiore Sanità, pediatri di libera scelta, neuropsichiatri infantili e associazioni scientifiche e di settore uniti per una valutazione sempre più efficace del neurosviluppo dei bambini. Questi sono i temi su cui la Sinpia e la Federazione italiana medici pediatri (Fimp), la Società italiana di pediatria (Sip), l'Associazione culturale pediatri (Acp), e il Sindacato medici pediatri di famiglia (Simpef) discutono nel convegno "Costituzione della rete pediatria-neuropsichiatria infantile per la diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo", che si tiene nella giornata del 4 novembre all'Iss.

SINPIA
Società Italiana di Neuropsichiatria
dell'Infanzia e dell'Adolescenza

fimp Federazione
Italiana
Medici *Pediatri*

Bilanci di salute

Valutazione del neurosviluppo con particolare attenzione alle competenze socio-comunicative

Gruppo di lavoro sui disturbi del neurosviluppo

Le strategie di sorveglianza: in quale servizio?

- NPIA: alto rischio
- Pediatria di Famiglia: popolazione generale
- Asili nido/scuole dell'infanzia: popolazione generale

RETE per il RICONOSCIMENTO PRECOCE

tra pediatri, asili nido e unità di neuropsichiatria infantile per anticipare la diagnosi e l'intervento attraverso specifici programmi di formazione e lo sviluppo di un protocollo per il riconoscimento/valutazione delle anomalie comportamentali precoci nella popolazione generale e ad alto rischio

DATABASE

Formazione educatori

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

AUTISM EARLY SIGNS IN INFANTS

1 Unusual visual fixations

Unusually strong and persistent examination of objects

2 Abnormal repetitive behaviors

Spending unusually long periods of time repeating an action, such as looking at their hands or rolling an object

3 Lack of age-appropriate sound development

Delayed development of vowel sounds, such as "ma ma, da da, ta ta"

4 Delayed intentional communication

Neutral facial tones and decreased efforts to gesture and gain parent attention

5 Decreased interest in interaction

Greater interest in objects than people and difficult to sustain face-to-face interactions

UCDAVIS
MIND INSTITUTE

Rete con gli asili nido/scuole dell'infanzia

La legge 107 del 13 luglio 2015, seguita dal Decreto legislativo 65 del 13 aprile 2017, ha finalmente istituito il **sistema integrato 0-6**. Questa legge riconosce in modo definitivo l'importanza del sistema educativo fin dai primi anni, promuove nuove professionalità più solide e nuove possibilità di costruire reti territoriali.

I servizi all'infanzia saranno messi nelle condizioni di svolgere con maggiore autorità e competenza un ruolo importante nella rete e in modo particolare nella **prima intercettazione di difficoltà e fragilità** e **nell'accoglienza dei bambini e dei genitori portatori di bisogni specifici**.

Questo ruolo potrà essere più autorevole grazie alla formazione di base universitaria degli educatori, una formazione permanente obbligatoria, e l'attivazione ovunque del coordinamento pedagogico territoriale.

Iniziative di Formazione

RETE CURANTE

Formazione di primo livello (medici, terapeuti e fornitori di servizi - operatori sanitari e assistenti sociali)

Formazione residenziale di secondo livello (medici pediatrici e neuropsichiatri infantili; operatori in servizio)

RETE EDUCATIVA (in collaborazione con il MIUR)

Formazione nelle scuole materne e primarie (personale didattico/insegnanti delle scuole materne e materne; insegnanti delle scuole primarie e secondarie)

FAMILIARI

Parent skills training (fascia 3-7 anni; fascia 0-3 in preparazione)
– formazione di dieci Master Trainers italiani

Take HOME MESSAGE

È necessario attivare un linguaggio comune attraverso momenti di formazione condivisi e la possibilità, per tutti i professionisti, di vedere i bambini nei diversi contesti e di lavorare, sempre, con il bambino tutto intero.

Grazie per l'attenzione

*Network Italiano per il riconoscimento precoce del
disturbo dello spettro autistico (NIDA)*

asdeu
Autism Spectrum Disorders
in the European Union

Ministero della Salute

Osservatorio Nazionale per il monitoraggio del
disturbo dello spettro autistico

**World Health
Organization**